

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
ГепОрнитин / ГераOrnitin
Биологически активная добавка ГепОрнитин не является лекарственным
средством.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 5 г (г).

Активное вещество: L-орнитин-L-аспартата 3 г (г)

Вспомогательные вещества: маннитол, ксилитол, коллоидный диоксид кремния, сахарин натрия, апельсиновый порошок (ароматизатор), лимонная кислота безводная, краситель желтый закат.

Свойства: L-орнитин-L-аспартат, входящий в состав биологически активной добавки ГепОрнитин, оказывает действие посредством аминокислот, орнитина и аспартата, которые участвуют в двух ключевых процессах детоксикации аммиака: синтезе мочевины и синтезе глутамина.

Синтез мочевины осуществляется в перипортальных гепатоцитах. В этих клетках орнитин выступает одновременно в качестве активатора ферментов орнитин-карбамоилтрансферазы и карбамоилфосфатсинтетазы и в качестве субстрата для синтеза мочевины.

Синтез глутамина осуществляется в перивенозных гепатоцитах.

Аспартат и другие дикарбоксилаты, включая метаболические продукты орнитина, поглощаются клетками и используются для связывания аммиака с образованием глутамина, особенно на фоне патологических состояний. Глутамат представляет собой аминокислоту, которая связывает аммиак как в физиологических, так и в патофизиологических условиях. Образующаяся аминокислота глутамин не только представляет собой нетоксичную форму выведения аммиака, но и активирует важный цикл образования мочевины (обмен глутамина).

L-орнитин-L-аспартат способствует выработке инсулина и соматотропного гормона. Улучшает белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального питания. Способствует уменьшению астенического, диспептического и болевого синдромов, а также нормализации повышенной массы тела (при стеатозе и стеатогепатите).

Биологически активная добавка **ГепОрнитин** может быть рекомендована при:

- острых и хронических заболеваниях печени, сопровождаемые гипергаммониемией;
- печеночной энцефалопатии (латентная или выраженная);
- стеатозах и стеатогепатитах различного генеза.

Способ употребления: Биологически активную добавку ГепОрнитин принимают внутрь.

Содержимое 1-2 пакетиков растворяют в достаточном объеме жидкости (например, в стакане воды, чая или сока) и принимают во время или после еды до 3 раз в сутки.

Готовый к использованию раствор следует употребить сразу после приготовления.

Побочное действие: Желудочно-кишечные нарушения: нечасто – тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диарея.

Указанные побочные действия обычно являются кратковременными и не требуют отмены приема биологически активной добавки.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к L-орнитин-L-аспартату или любому из вспомогательных веществ.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность: Не следует применять при беременности

Период грудного вскармливания: Не следует применять в период грудного вскармливания.

Дети: Не следует применять детям.

Предостережения: Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Не использовать при повреждении упаковки.

Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.

Форма выпуска: гранулят.

Упаковка: 1 саше по 5г (г), 30 саше в картонной упаковке.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Производитель: Байодил Фармасьютикалз Лтд., Вилл. Сайни Маджра, Налагар Ропар Роуд, Налагар-174101, Дистт. Солан (Х.П.), Индия (Сертифицирован WHO-GMP).