

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ЛизоБактил / LizoBacitil

Биологически активная добавка ЛизоБактил не является лекарственным средством.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Таблетки для рассасывания
Масса 1 таблетки: 530 ± 5% мг (mg).
Форма выпуска: таблетки без оболочки.

Состав: 1 таблетка без оболочки содержит: инулин – 160 мг (mg), лизоцим – 20 мг (mg), витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) – 0,5 мг (mg).
Вспомогательные вещества: маннитол, ксилитол, крахмал кукурузный, коллоидный диоксид кремния, магния стеарат, аспартам.

Свойства: Основной компонент ЛизоБактила - Лизоцим - антибактериальный фермент, содержащийся почти во всех тканях и жидкостях организма, как средство, предназначенное для защиты от инфекционных возбудителей, - присутствует в лейкоцитах, слизистых оболочках, грудном молоке, слезной жидкости, коже, особенно много его в слюне.
Лизоцим обладает способностью разрушать структурную основу клетки микроорганизмов, нейтрализуя причину воспаления и боли в горле: болезнетворные бактерии и грибы.

Лизоцим эффективно используется в ЛОР-практике и стоматологии в комбинации с другими веществами при ларингитах, гайморитах, фарингитах, афтозных стоматитах. Лизоцим выступает в качестве антимикробного агента, вынуждая бактериальную стенку лопаться под собственным внутренним давлением, также эффективно способен разрушать и стенки дрожжевых клеток.

Лизоцим в высокой концентрации находится в фагоцитах, его активность увеличивается при микробной инфекции, чем и объясняется способность к разрушению клеточных оболочек бактерий. Он обладает иммуномодулирующими, разжижающими и противовоспалительными свойствами, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, предотвращает колонизацию патогенных микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте.

Наш организм производит лизоцим постоянно, но такие факторы как хронические инфекции, низкая кислотность желудка, прием антибиотиков, дефицит питательных веществ, курение, переутомление, переохлаждение, плохое состояние окружающей среды истощают его запасы и снижают способность производить новые ферменты и защищать себя. К тому же с возрастом наш организм производит все меньше ферментов, поэтому ему может потребоваться дополнительный лизоцим.

Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) - также входит в состав ЛизоБактила.
Он оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта, участвует почти во всех обменных процессах организма, эффективен в отношении почти всех видов заболеваний кишечника, возникающих на фоне нарушения его всасывания, поддерживая тем самым здоровый иммунитет организма.

Инулин - органическое вещество из группы сложных углеводов, полисахаридов, получаемых в результате переработки корней и клубней некоторых растений, относится к группе пищевых волокон. Инулин не переваривается в верхнем пищеварительном тракте и доходит до кишечника в практически неизменном виде, становясь пищей для содержащихся там бифидобактерий, которые в следствие этого активно размножаются. Инулин - пребиотик, обеспечивающий защиту от дисбактериоза и патогенных бактерий. При систематическом употреблении в виде добавки инулин оказывает благотворное воздействие на организм, очищая его, укрепляет иммунную систему, помогает усваиваться полезным минералам, нормализуя пищеварение и обмен веществ.

Показание: Биологически активная добавка ЛизоБактил может использоваться при инфекционно-воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, десен и гортани:

- гингивит;
- стоматит;
- катаральные явления верхних отделов дыхательных путей;
- афтозные изъязвления;
- герпетические поражения слизистой оболочки полости рта (в составе комплексной терапии);
- эрозии слизистой оболочки полости рта различной этиологии.

Способ употребления: биологически активную добавку ЛизоБактил применяют местно в полости рта рассасывая. Детям в возрасте 3-7 лет – по 1 таблетке 3 раза в сутки, детям в возрасте 7-12 лет - по 1 таблетке 3-4 раза в сутки; взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке 3-4 раза в сутки.

Противопоказания:
- повышенная чувствительность к лизоциму, витамину B6, инулину, или к любому из вспомогательных веществ;
- детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно применение данного средства при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение у детей
Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

Особые указания
В случае появления аллергической реакции применение средства необходимо прекратить. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.
Не используйте по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Упаковка: 30 таблеток, по 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре до 250С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.

Производитель: Байодил Фармасьютикалз Лтд., Вилл. Сайни Маджра, Налагар Ропар Роуд, Налагар-174101, Дистт. Солан (Х.П.), Индия (Сертифицирован WHO-GMP).

Произведено эксклюзивно для ООО «Лети»

